

Aufruf zur Kartierung 2022 – Die Steckbriefe der Pflanzenarten des Monats Juli


Für den Juli haben wir uns für vier sehr schöne Pflanzenarten entschieden, auf die wir bitten besonders zu achten und uns zu melden:

- *Betonica officinalis*,
- *Prunella grandiflora*,
- *Scabiosa canescens*,
- *Scabiosa columbaria*.

Alle genannten Pflanzenarten wachsen in Trocken- oder Magerrasen und gelten in Sachsen-Anhalt als gefährdet. Weitere Informationen sind nachfolgend in den Artsteckbriefen zu finden.

Bitte meldet uns mittels unserer Erfassungs-App oder über das Online-Portal auf unserer Homepage entsprechende Fundpunkte. Selbstverständlich können auch alle weiteren botanischen Funde ebenso gemeldet werden.

Viel Erfolg beim Suchen und Erfassen mit der Flora-ST-App!




Heil-Ziest – *Betonica officinalis* L., 1753 subsp. *officinalis*

Standort: wechsellrockene bis -feuchte, extensiv genutzte Magerrasen, Halbtrockenrasen, Moorwiesen, lichte Laubmischwälder und ihre Säume, basenhold

Wichtigste Merkmale: Lippenblütengewächs, 0,30–1,00 m Höhe, purpurrote Blüten, selten auch weiß, Blattspreite ca. 3mal so lang wie breit, deutliche Zähnung und Netznervatur

Blütezeit (Monate): Juli–August

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Daniel Elias, Ulrike Schröder-Trost


Großblütige Braunelle – *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, 1775 subsp. *grandiflora*

Standort: Halbtrockenrasen, Trockenwäldersäume, kalkhold

Wichtigste Merkmale: Lippenblütengewächs, 0,10–0,30 m Höhe, Blüte blauviolett, Blüte 20–25 mm lang, 2–3mal so lang wie der Kelch, oberstes Laubblattpaar vom Blütenstand entfernt

Blütezeit (Monate): Juni–August

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Ralph Ohlhoff, Jens Stolle


Graue Skabiose – *Scabiosa canescens* Waldst. & Kit., 1801

Standort: kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen, Trockenwälder-, Gebüsche und Ihre Säume, kalkhold

Wichtigste Merkmale: Kardengewächs, 0,20–0,50 m Höhe, Blüte hellblau, duftend, Kelchborsten bleichgelb, Grundblätter ungeteilt, ganzrandig oder mit einzelnen Zähnen

Blütezeit (Monate): Juli–November

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Andreas Korschefsky, Dieter Frank


Tauben-Skabiose – *Scabiosa columbaria* L., 1753 subsp. *columbaria*

Standort: submediterran geprägte Trocken- und Halbtrockenrasen, mäßig trockene bis wechsellückige Wiesen, kalkhold

Wichtigste Merkmale: Kardengewächs, 0,25–0,60 m Höhe, Blüte blau bis rotviolett, Kelchborsten schwärzlich, Grundblätter von Beginn an gefiedert, Blätter meist fein kraushaarig

Blütezeit (Monate): Juli–November

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Uta Anhalt, Eckhard Willing

Legende der Verbreitungskarten:

Legende	
● Normalstatus ab 2010 ● Normalstatus 1992 bis 2009 ● Normalstatus 1950 bis 1991 ○ Normalstatus vor 1950 ◆ eingebürgerter Neophyt ab 2010 ◆ eingebürgerter Neophyt 1992 bis 2009 ◆ eingebürgerter Neophyt 1950 bis 1991 ◇ eingebürgerter Neophyt vor 1950 ▼ unbeständiger Neophyt ab 2010 ▼ unbeständiger Neophyt 1992 bis 2009 ▼ unbeständiger Neophyt 1950 bis 1991 ▽ unbeständiger Neophyt vor 1950	■ kultiviert ab 2010 ■ kultiviert 1992 bis 2009 ■ kultiviert 1950 bis 1991 □ kultiviert vor 1950 † ausgestorben / verschollen nach 2009 - veröffentlichte Fehlangebe ? zweifelhafte Angabe ○ allgemeine geographische Unschärfe ○ geographische Unschärfe nach Norden ○ geographische Unschärfe nach Osten ○ geographische Unschärfe nach Süden ○ geographische Unschärfe nach Westen

Quellen:

- Frank, D., Brade, P., Elias, D., Glowka, B., Hoch, A., John, H., Keding, A., Klotz, S., Korschefsky, A., Krumbiegel, A., Meysel, F., Schütze, P., Stolle, J., Warthemann, G., Wegener, U. (2020): Rote Listen Sachsen-Anhalt: Farne und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta). Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 1/2020: 151–186. Verfügbar unter <https://lau.sachsen-anhalt.de/wir-ueber-uns-publikationen/fachpublikationen/berichte-des-lau/rote-listen-sachsen-anhalt-2020/>
- Jäger, E. (Hrsg.) (2017): Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Auflage – Spektrum, Heidelberg, 930 S.
- Jäger, E., Müller, F., Ritz, C., Welk, E., Wesche, K. (Hrsg.) (2017): Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Atlasband. 13. Auflage – Spektrum, Heidelberg, 824 S.
- <http://www.blumeninschwaben.de/>
- <http://botanischer-verein-sachsen-anhalt.de/flora-st/>