

Aufruf zur Kartierung 2022 – Die Steckbriefe der Pflanzenarten des Monats August

Bitte achtet im August auf folgende vier Pflanzenarten besonders:

Althaea officinalis,

Malva thuringiaca,

Serratula tinctoria,

Veronica spicata.

Die genannten Arten wachsen in sehr unterschiedlichen Lebensräumen, welches von Salzwiesen bis Trockenrasen reicht. Bitte meldet uns mittels unserer Erfassungs-App oder über das Online-Portal auf unserer Homepage entsprechende Fundpunkte. Selbstverständlich können auch alle weiteren botanischen Funde ebenso gemeldet werden.

Viel Erfolg beim Suchen und Erfassen mit der Flora-ST-App!




Echter Eibich – *Althaea officinalis* L., 1753

Standort: nasse bis wechselfeuchte Salzweiden und -röhrichte, Graben- und Wegränder, nährstoffanspruchsvoll

Wichtigste Merkmale: Malvengewächs, 0,60–1,20 m Höhe, weiße Blüten, Blüte 3–5 cm, in den Blattachsen büschlig gehäuft, Stängel und Blätter samtig filzig

Blütezeit (Monate): Juli–September

Rote Liste Sachsen-Anhalt: Vorwarnliste



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Uta Anhalt, Michael Bulau


Thüringer Strauchpappel – *Malva thuringiaca* (L.) Vis., 1850–1852 subsp. *thuringiaca*

Standort: Salzwiesen, Wegränder, nährstoffanspruchsvoll

Wichtigste Merkmale: Malvengewächs, 0,50–1,25 m Höhe, Blüte hellrosa, dunkel geadert, Blüte 5–8 cm, untere Blätter 5eckig, obere 3–5lappig, Pflanze mit Sternhaaren

Blütezeit (Monate): Juli–August

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Daniel Elias


Färber-Scharte – *Serratula tinctoria* L., 1753 subsp. *tinctoria*

Standort: wechselfeuchte, meist extensiv genutzte Wiesen, wechselfeuchte Halbtrocken- und Silikatmagerrasen, Grabenränder, lichte Laubmischwälder und ihre Ränder, basenhold

Wichtigste Merkmale: Korbblütengewächs, 0,20–1,00 m Höhe, Köpfe in Rispen oder Schirmrispen, Hüllblätter an der Spitze purpurrot

Blütezeit (Monate): Juli–September

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Michael Bulau, Jessica Arland-Kommraus


Ähriger Blauweiderich – *Veronica spicata* L., 1753 subsp. *spicata*

Standort: Silikat- und reichere Sandtrockenrasen, Trockengebüchsäume, kalkmeidend

Wichtigste Merkmale: Wegerichgewächs, 0,15–0,40 m Höhe, Blüte lilafarben, Blattspreite meist 1–5 cm lang, stumpf, meist fein gekerbt, die obersten Blätter oft wechselständig, Kelchblätter auf der Fläche dicht drüsenhaarig und am Rand lang abstehend drüsenlos bewimpert

Blütezeit (Monate): Juli–September

Rote Liste Sachsen-Anhalt: gefährdet



Kartendarstellung: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: 12/2021

Legende: siehe unten

Fotos (von oben nach unten): Andreas Korschefsky, Rainer Ohlhoff

Legende der Verbreitungskarten:

Legende	
● Normalstatus ab 2010 ● Normalstatus 1992 bis 2009 ● Normalstatus 1950 bis 1991 ○ Normalstatus vor 1950 ◆ eingebürgerter Neophyt ab 2010 ◆ eingebürgerter Neophyt 1992 bis 2009 ◆ eingebürgerter Neophyt 1950 bis 1991 ◇ eingebürgerter Neophyt vor 1950 ▼ unbeständiger Neophyt ab 2010 ▼ unbeständiger Neophyt 1992 bis 2009 ▼ unbeständiger Neophyt 1950 bis 1991 ▽ unbeständiger Neophyt vor 1950	■ kultiviert ab 2010 ■ kultiviert 1992 bis 2009 ■ kultiviert 1950 bis 1991 □ kultiviert vor 1950 † ausgestorben / verschollen nach 2009 - veröffentlichte Fehlangebe ? zweifelhafte Angabe ○ allgemeine geographische Unschärfe ○ geographische Unschärfe nach Norden ○ geographische Unschärfe nach Osten ○ geographische Unschärfe nach Süden ○ geographische Unschärfe nach Westen

Quellen:

- Frank, D., Brade, P., Elias, D., Glowka, B., Hoch, A., John, H., Keding, A., Klotz, S., Korschefsky, A., Krumbiegel, A., Meysel, F., Schütze, P., Stolle, J., Warthemann, G., Wegener, U. (2020): Rote Listen Sachsen-Anhalt: Farne und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta). Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 1/2020: 151–186. Verfügbar unter <https://lau.sachsen-anhalt.de/wir-ueber-uns-publikationen/fachpublikationen/berichte-des-lau/rote-listen-sachsen-anhalt-2020/>
- Jäger, E. (Hrsg.) (2017): Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Auflage – Spektrum, Heidelberg, 930 S.
- Jäger, E., Müller, F., Ritz, C., Welk, E., Wesche, K. (Hrsg.) (2017): Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Atlasband. 13. Auflage – Spektrum, Heidelberg, 824 S.
- <http://www.blumeninschwaben.de/>
- <http://botanischer-verein-sachsen-anhalt.de/flora-st/>